

DIRECTIONS:

Mediclean® Disinfectant Spray II should be applied with hand or power operated sprayers, foggers, automated metering systems or gravity drip dispensers to areas where disease causing bacteria, mold and mildew-causing fungi and odors usually thrive. Surfaces and objects must be cleaned of gross filth with suitable detergent before treatment. Spray on surface at a distance of not over 30 cm until thoroughly wet. It is not necessary to wipe the sprayed surface. May be applied with a sponge to impervious covers and surfaces. Allow treated surfaces and objects to remain wet for 10 minutes. For fogging and other large volume applications use appropriate spraying equipment, protective clothing, gloves and respirator. Heavily treated spaces should be adequately ventilated and not reentered for at least one hour after treatment.

Proven effective to kill Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Influenza A and B viruses, and Trichophyton interdigitale.

For use in bedrooms, on furniture, equipment, washroom fixtures and other surfaces where disease-causing bacteria may be present and where mold and mildew-causing fungi may exist.

Recommended for wide-range disinfectant use in wards, lobbies, hallways, washrooms, mop rooms, furniture, shoes, laboratories, restaurant areas, and other areas.

Mediclean Disinfectant Spray II, when used as directed, is effective in cleaning and deodorizing bedding, mattresses, textiles, drapes, upholstered furniture, rugs, carpets and in storage areas to control mold, mildew, and odors wherever they are a problem. This product is NOT for use to disinfect/sanitize fabrics/soft surfaces.

For use on pre-cleaned hard non-porous surfaces such as tile, porcelain, waste receptacles, compactors, food service areas, restaurants, on, in and around restroom fixtures, locker rooms, telephones, doorknobs, containerized storage units, shower stalls or wherever bacteria, fungi, mildew and odors exist.

If so applied Mediclean Disinfectant Spray II will act against many germs and fungi and against odors caused by such organisms. Also against Athletes Foot Fungi.

KILLS MOLD & MILDEW • ELIMINATES ODORS

Mediclean Disinfectant Spray II is a bactericide against most gram positive germs such as Staphylococcus aureus as well as a bactericide against many gram negative bacteria, and influenza viruses. Mediclean Disinfectant Spray II should be applied to clean surfaces if disinfection is desired.

Mediclean Disinfectant Spray II is active in the control of influenza in addition to controlling mold and mildew-causing fungi. Mediclean Disinfectant Spray II controls odors resulting from bacteria and fungi organisms. For mildew control, clean all surfaces (walls, floors, and hard surfaces) before application. Spray until

moist. Repeat application weekly or as necessary to maintain effective control.

Mediclean Disinfectant Spray II is non-staining and dries rapidly. It will not damage metal, tile surfaces, painted walls, and furniture.

For surfaces and/or objects that may come into direct contact with food and/or with children at the mouthing stage of development, a rinse with potable water is recommended.

WARNING:

Skin and Eye Irritant. Harmful if swallowed. Avoid contact with skin and eyes. Avoid inhalation of spray. Wear suitable protective clothing. In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. Foods should be covered or removed during treatment. When using this product in these areas, apply only when the facility is not in operation.

First Aid: Ingestion- Do not induce vomiting. Drink two (2) glasses of water. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Seek medical attention immediately. **Inhalation-** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, and begin artificial respiration. **Eyes-** Flush thoroughly with water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. If irritation persists, seek medical attention. **Skin-** wash skin with plenty of soap and water. If irritation persists, seek medical attention.

STORAGE: Keep from freezing. Store in ventilated areas. Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

DISPOSAL: For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the appropriate municipal/provincial/territorial agency or product stewardship organization. **Container Disposal:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Triple rinse (or equivalent). Dispose of the empty container in accordance with municipal/provincial/territorial requirements. Offer for recycling, if available.

MODE D'EMPLOI :

Mediclean® Vaporisateur Désinfectant II doit être appliqué avec pulvérisateurs manuels ou motorisés, nébulisateurs, systèmes automatisés de dosage ou distributeurs d'irrigation au goutte-à-goutte par gravité, sur les zones où se développent les bactéries pathogènes, les moisissures et le mildiou provoquant des odeurs et des champignons. Avant le traitement, on doit enlever les saletés visibles des surfaces et des objets avec un détergent adéquat. Pulvériser sur la surface à une distance n'excédant pas de 30 cm jusqu'à ce que soit mouillée. Il n'est pas nécessaire d'effacer la surface vaporisée. Peut être appliqué, avec une éponge, sur les surfaces et les couvertures imperméables. Laisser rester humides les objets et les surfaces traitées pendant 10 minutes. En cas de brumisation

mediclean®

DISINFECTANT SPRAY II

VAPORISATEUR DÉSINFECTANT II

FUNGICIDE • BACTERICIDE • VIRUCIDE
DISINFECTANT • ODOR CONTROL AGENT (ANTI-MICROBIAL)
FONGICIDE • BACTÉRICIDE • VIRUCIDE
DÉSINFECTANT • AGENT ANTI-ODEUR (ANTI-BACTÉRIEN)

KILLS MOLD AND MILDEW / TUE LA MOISSURE ET LE MILDIU
ELIMINATES ODORS / ÉLIMINE LES ODEURS

PERCENTAGE/POURCENTAGE

o-Phenylphenol/o-phénylphénol0.22% w/w
 Benzethonium chloride/ Chlorure de benzéthonium0.70% w/w

Read the Label Before Using / Lire l'étiquette avant l'emploi

WARNING - AVERTISSEMENT

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NET CONTENT: / CONTENU NET : 3.785 Litres

DIN 02486342

MANUFACTURED FOR: / FABRIQUÉ DE: **ProRestore® Products**

15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 • 1-800-932-3030 • www.legendbrandsrestoration.com

©2019 ProRestore® Products / 1904

• Shake well before and during use • Bien agiter avant et pendant l'utilisation •

ou application en volume important, il est recommandé d'utiliser un équipement approprié de pulvérisation, des vêtements de protection, des gants et des masques. Les espaces fortement traités devraient être bien ventilés et réintégrés seulement au moins une heure après le traitement.

Efficacité prouvée contre Staphylococcus aureus, Salmonella Enterica, les virus grippaux A et B et Trichophyton interdigitale.

À utiliser dans les chambres à coucher, sur les meubles, l'équipement, les appareils sanitaires et d'autres surfaces où les bactéries pathogènes peuvent être présentes et peuvent se développer les moisissures et le mildiou.

Il est recommandé comme désinfectant à spectre ample pour utilisation dans: salles, halls, vestibules, toilettes, espaces de rangement des vadrouilles, meubles, chaussures, laboratoires, restaurants et autres secteurs.

Mediclean Vaporisateur Désinfectant II, s'il est utilisé en suivant les instructions, est efficace pour nettoyer et désodoriser la literie, les matelas, les textiles, les rideaux, les meubles rembourrés, les tapis et les moquettes, et dans les espaces de rangement pour contrôler les moisissures, le mildiou et les odeurs où qu'ils se trouvent et qu'ils soient un problème. Ce produit NE DOIT PAS être utilisé pour désinfecter/assainir les surfaces ou les tissus souples.

Pour utiliser sur des surfaces dures non poreuses pré-nettoyées, telles que: carreau, porcelaine, paniers à rebuts, compacteurs, espaces de service alimentaire, restaurants; sur, dans ou autour appareils sanitaires, vestiaires, téléphones, poignées de porte, unités conteneurisées de stockage, cabines de douche ou partout où les bactéries, les champignons, le mildiou ou les odeurs se développent Dans ce cas, Mediclean Vaporisateur Désinfectant II est efficace sur de nombreux germes et moisissures et contre l'odeur causée par ces organismes. Aussi efficace contre le Pied d'Athlète.

TUE LA MOISSURE & LE MILDIU • ÉLIMINE LES ODEURS

Mediclean Vaporisateur Désinfectant II est bactéricide contre un grand nombre de bactéries à gram positif, telle que Staphylococcus aureus, et il est aussi bactéricide contre de nombreuses bactéries gram-négatives et virus de la grippe. Quand on souhaite procéder à la désinfection, Mediclean Vaporisateur Désinfectant II doit être appliqué sur des surfaces propres.

Mediclean Vaporisateur Désinfectant II est actif pour contrôler la grippe en plus de contrôler les moisissures et le mildiou. Mediclean Vaporisateur Désinfectant II contrôle les odeurs causées par les bactéries et les champignons. Pour contrôler le mildiou, nettoyer toutes les surfaces (murs, planchers et surfaces dures) avant l'application. Pulvériser la surface jusqu'à ce que soit mouillée. Répéter l'application une fois par semaine ou selon les besoins pour maintenir un contrôle efficace.

Mediclean Vaporisateur Désinfectant II ne tache pas et sèche rapidement. Il

n'endommage pas le métal, les surfaces en carrelage, les murs peints ni les meubles.

Pour les surfaces et/ou les objets pouvant entrer en contact avec les aliments et/ ou les enfants au stade orale de développement, il est recommandé un rinçage à l'eau potable.

AVERTISSEMENT :

Irritant pour la peau et les yeux. Nocif si avalé. Éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux. Éviter d'inhaler les embruns de pulvérisation. Porter un vêtement de protection approprié. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. La nourriture devrait être retirée ou couverte au cours du traitement. Lorsqu'on utilise ce produit dans ces secteurs, appliquer seulement quand l'établissement n'est pas en fonctionnement.

Premiers soins: Ingestion – Ne pas provoquer le vomissement. Donner à boire deux (2) verres d'eau. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Obtenir immédiatement des soins médicaux. **Inhalation-** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si elle ne respire plus, appeler le 911 ou l'ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle. **Yeux** - Rincer abondamment les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Si la personne porte des lentilles cornéennes, les retirer après 5 minutes, puis continuer à rincer. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. **Peau-** En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup de savon et d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

ENTREPOSAGE : Garder à l'abri du gel. Entreposer dans un endroit aéré. Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux par l'entreposage ou l'élimination.

ÉLIMINATION : Pour obtenir de l'information sur l'élimination des produits non utilisés ou superflus, veuillez communiquer avec le fabricant ou avec l'organisme provincial, territorial ou municipal compétent, ou l'organisme industriel de gestion des produits. Élimination des contenants: Contenant à usage unique. Ne pas réutiliser ou remplir le contenant. Rincer le contenant trois fois (ou l'équivalent). Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale, territoriale et municipale. Envoyer au recyclage, si possible.

MEDICLEAN DISINFECTANT SPRAY II GALLON



118227 (221261000)

109432 B

8 47136 00272 6